



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
12 de Diciembre 2025

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios **Semana Epidemiológica 49**

- Semana 49 mantiene casos en nivel bajo de VRS (16 versus 25 semana pasada), similar que registro 2024 misma semana (17)
- Influenza A: franca disminución con respecto a semana pasada (482 versus 643 semana pasada), aún muy elevado comparado con misma semana año 2024 (68)

Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas

II. Alertas Internacionales

Influenza estacional: **Situación mundial**

- La actividad de influenza estacional ha aumentado a nivel mundial, con mayor proporción de virus A(H3N2)
- Los virus de influenza estacional, incluido A(H3N2), evolucionan continuamente. Desde agosto 2025 se ha observado un rápido aumento del subclado A(H3N2) J.2.4.1 alias K en varios países
- Estos virus del subclado K presentan varias diferencias con respecto a los virus A(H3N2) relacionados
- Los datos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una evolución notable
- Las primeras estimaciones sugieren que la vacuna continúa brindando protección contra la

hospitalización, aunque su eficacia contra enfermedad clínica debe ser monitoreada

- Durante la temporada de influenza de 2025 en las Américas, la transmisión superó el umbral estacional a mediados de marzo. La circulación fue impulsada por influenza A(H1N1)pdm09, alcanzando una positividad máxima del 19%
- Posteriormente, la actividad disminuyó a niveles bajos hasta finales de agosto, cuando se observó un aumento de influenza A(H3N2) en Brasil y Chile
- A principios de noviembre, Chile se mantenía en niveles moderados de transmisión, sin evidencia de aumento de gravedad
- Hasta el 4 de noviembre, no se había detectado el subclado K en Sudamérica

Nota informativa: Influenza A(H3N2) subclado K (J.2.4.1), consideraciones para las Américas

- La OPS/OMS publicó una nota informativa sobre la detección y circulación del subclado K/J.241 del virus de influenza A(H3N2), una variante derivada de la evolución genética del virus estacional
- A la fecha, no se ha registrado aumento inusual de gravedad asociado al subclado
- OPS/OMS recomienda: Reforzar la vigilancia virológica y genética, mantener la preparación de los servicios de salud ante aumentos estacionales, fortalecer la comunicación de riesgos y la vacunación estacional

Actualización epidemiológica: tosferina (Coqueluche) en las Américas

- A nivel mundial, durante el 2024 se notificaron 977.000 casos de tosferina, registrando un incremento de 5,8 veces en comparación con 2023
- En la Región de las Américas, se observó una disminución entre el 2015 y 2019, y en 2021-2022. Posteriormente, se registró un aumento entre el 2023 y 2024
- Durante la pandemia, descendieron las coberturas de vacunas DTP1 y DTP3
- En Chile, hasta la SE 47, se han confirmado 2.424 casos de tosferina, con una tasa de incidencia acumulada de 12 casos por 100.000 habitantes
- Se han notificado casos en todas las regiones, observándose mayores tasas en las regiones del sur

III. Alertas Nacionales

Actualización de situación de sarampión en las Américas y reiteración de alerta

- Entre las semanas epidemiológicas 1 y 46, se han confirmado 12.912 casos de sarampión en las Américas, cifra 29 veces superior al 2024
- Del total, el 93% de las hospitalizaciones no estaban vacunados o la información se desconocía, evidenciando brechas

en inmunización

- Considerando esto, se instruye a las SEREMI intensificar la vigilancia y reforzar la inmunización programática, en viajeros y personas nacidas en 1971-1981, si corresponde

Medidas para reforzar vigilancia, diagnóstico y continuidad de Red Asistencial ante aumento de virus respiratorios

- La vigilancia epidemiológica evidencia un aumento de circulación de virus respiratorios fuera de temporada estacional, especialmente Influenza tipo A y aumento de SARS-CoV-2
- Este comportamiento es esperable y coherente con las fluctuaciones de los últimos años
- Se instruye a los Servicios de Salud: reforzar vigilancia epidemiológica, continuidad de red asistencial, prevención de IAAS y comunicación de riesgos

IV. Estudios y otras alertas

Estudio confirma que vacunas contra Covid no aumentaron las tasas de mortalidad en Francia

- Las vacunas contra COVID-19 no incrementaron mortalidad en Francia, según estudio de 30 millones de adultos
- Durante cuatro años posteriores a la primera dosis, el 0,4% de personas vacunadas falleció por cualquier causa, versus el 0,6% de no vacunados

Artículo: Temporada de influenza extendida en Australia y Nueva Zelanda debido a influenza A(H3N2) subclado K

- Las temporadas de influenza varían ligeramente en cuanto a su inicio, intensidad, gravedad y duración
- Numerosos factores contribuyen, como temperatura, precipitaciones, humedad, los tipos/subtipos de virus, la inmunidad, así como viajes nacionales e internacionales
- La temporada de influenza australiana 2025 registró un número récord de casos de influenza (457.906 casos del 1 de enero al 28 de noviembre) y una temporada inusualmente larga desde mayo a noviembre
- Nueva Zelanda tuvo una temporada más moderada, pero con una cola más larga de lo habitual

ECDC liderará integración de vigilancia basada en aguas residuales a nivel europeo

- El ECDC anunció su plan para liderar la consolidación de vigilancia basada en aguas residuales
- Se propone: establecer red europea; organizar consultas con partes interesadas para identificar patógenos candidatos y problemas de salud; apoyar la integración de datos; entre otros

Nuevo análisis de expertos OMS reafirma que NO existe vínculo entre vacunas y autismo

- Un nuevo análisis de comité de expertos concluyó que no existe relación causal entre vacunas y trastornos del espectro autista (TEA)
- El análisis se centró en la relación entre vacunas con tiomersal, adjuvantes basados en aluminio y los TEA: la evidencia respalda el perfil de seguridad de las vacunas

Cinco años de vacunas contra la COVID-19: cómo un avance creó crisis de confianza

- El 8 de diciembre de 2020, una mujer británica fue la primera persona del mundo en recibir la vacuna contra COVID-19
- Cinco años después, se han administrado más de 13.640 millones de dosis, y gracias a ellas, la OMS declaró el fin de la emergencia en mayo de 2023
- Lamentablemente, la falta de comunicación y la desconfianza han disminuido la aceptación de las vacunas
- Es importante que científicos/as y autoridades fortalezcan habilidades de comunicación de riesgos

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.