



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
19 de Diciembre 2025

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 50

- Semana 50 mantiene casos en nivel bajo de VRS (12 versus 16 semana pasada), similar que registro 2024 misma semana (14)
- Influenza A: disminución con respecto a semana pasada (375 versus 482 semana pasada), aún muy elevado comparado con misma semana año 2024 (83)

Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas

II. Alertas Nacionales

MINSAL confirma detección de subclado K de influenza A(H3N2) en Chile

- El Ministerio de Salud informa la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado dado el comportamiento global del virus
- El ISP intensificó el análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2). Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K
- Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas

Alerta epidemiológica por circulación de Influenza A (H3N2) subclado K

- el 12 de diciembre de 2025 Brasil informó por primera vez el subclado K en un caso importado desde Fiji, en Pará mientras que el 15 de diciembre el Minsa de Perú confirmó 2 casos

por el mismo motivo

- A nivel nacional, durante 2025 se registró una circulación temprana del virus de influenza, alcanzando su peak en la semana epidemiológica 18 con predominio del subtipo A(H1N1), mientras que, en el segundo semestre, se observó un aumento progresivo de casos asociados a A(H3N2), con peak cercano a la semana epidemiológica 46
- Con fecha 18/12/2025, el ISP informó la reclasificación internacional realizada por GISAID de un caso con fecha de obtención de muestra el 04/11/2025, desde Influenza A H3N2 J.2.4, hacia subclado J.2.4.1, correspondiente al subclado K
- Recomendaciones: fortalecer vigilancia epidemiológica y vigilancia de laboratorio. Ante la obtención de muestras de influenza A no subtipificadas, comunicarse inmediatamente con ISP y Epidemiología regional para envío de muestra, promover vacunación

Entrevista a epidemióloga UNAB por riesgo de la «supergripe» H3N3

- La expansión acelerada de la denominada “supergripe” H3N2 en el Reino Unido y otros países del hemisferio norte ha encendido las alertas sanitarias internacionales
- Se trata de un subtipo del virus influenza A que, según explicó María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica de la Universidad Andrés Bello, presenta mutaciones más marcadas que en años anteriores, lo que ha tensionado los sistemas de salud europeos en pleno invierno

III. Estudios y otras alertas

Declaración sobre la composición de las vacunas contra la COVID-19

- El Grupo Asesor de la OMS sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 celebró su reunión semestral en diciembre de 2025 para revisar la evolución del SARS-CoV-2, el desempeño de las vacunas y las implicaciones para la composición del antígeno de la vacuna
- Tras esta reunión, el Grupo informa que el antígeno recomendado es el LP.8.1 monovalente
- Los antígenos del linaje JN.1 (JN.1 o KP.2) recomendados anteriormente siguen siendo alternativas adecuadas, y la vacunación no debe retrasarse en previsión del acceso a vacunas con la composición LP.8.1

Orientación de la OMS sobre el uso de vacunas contra influenza humana A(H5) durante períodos interpandémicos

- La OMS publicó nuevas

orientaciones sobre el uso de vacunas contra influenza humana A(H5) durante períodos interpandémico y de emergencia, actualizando las recomendaciones de 2009 y 2013

- Desde 2003 hasta septiembre de 2025, se han reportado 991 casos humanos de influenza A(H5N1) en 25 países, con 476 muertes
- Los virus A(H5), particularmente el clade 2.3.4.4b, han mostrado una propagación geográfica sin precedentes desde 2020, causando brotes en ganado lechero en Estados Unidos desde marzo de 2024
- Actualmente existen al menos 21 vacunas A(H5) con licencia, de las cuales 13 están autorizadas
- La OMS recomienda que los países consideren la vacunación de grupos con mayor riesgo de exposición ocupacional: trabajadores de laboratorio, primeros respondedores ante brotes en animales, personas con contacto continuo con animales en áreas afectadas, y trabajadores de salud que atienden casos sospechosos o confirmados
- La vacunación NO se recomienda actualmente para la población general

Los confinamientos por COVID pueden haber ralentizado el desarrollo de los niños pequeños

- Un estudio vincula los confinamientos y las medidas de distanciamiento físico durante la pandemia de COVID-19 con retrasos en el desarrollo en áreas como el habla y el lenguaje, el movimiento físico y el crecimiento emocional en niños pequeños
- Los investigadores analizaron datos de niños de 13 a 15 meses y de 27 a 30 meses de 257.532 niños pequeños en Escocia, entre enero de 2019 y agosto de 2023

Las exposiciones ocupacionales están vinculadas a un mayor riesgo de long COVID

- Los factores laborales podrían aumentar el riesgo de desarrollar long COVID-19, según un nuevo estudio poblacional realizado en España
- Los hallazgos sugieren que los principales factores laborales que aumentan el riesgo de long COVID-19 fueron el uso irregular o limitado de respiradores, el contacto cercano con compañeros de trabajo o con el público, la imposibilidad de mantener la distancia física y el uso del transporte público para desplazarse al trabajo
- Si bien varios factores no

relacionados con el trabajo se asociaron con un mayor riesgo de long COVID, incluido el sexo femenino, la obesidad, múltiples afecciones subyacentes e infecciones más graves o repetidas, la ocupación surgió como un determinante fuerte e independiente del riesgo

Los casos de gripe aviar en la fauna silvestre se han cuadruplicado

- Los virus de la influenza aviar están matando a un número cada vez mayor de animales salvajes y alterando los ecosistemas de todo el mundo
- Desde 2021, la enfermedad se ha propagado por los continentes, afectando a una gama sin precedentes de especies de aves y mamíferos, y generando gran preocupación por la biodiversidad y su posible propagación a humanos, ganado y mascotas
- Estas muertes también tienen consecuencias ecológicas de gran alcance. Cuando las poblaciones animales disminuyen y la reproducción se ve alterada, ecosistemas enteros pueden perder estabilidad, amenazando la supervivencia de las especies durante generaciones

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.