



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
26 de Diciembre 2025

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 51

- Semana 51 disminuyen casos de VRS (6 versus 12 semana pasada), similar que registro 2024 misma semana (13)
- Influenza A: disminución marcada con respecto a semana pasada (275 versus 375 semana pasada), aún elevado comparado con misma semana año 2024 (70)

Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas

II. Alertas Internacionales

Alerta epidemiológica Síndrome Pulmonar por Hantavirus en la Región de las Américas

- En 2025 y hasta la semana epidemiológica 47, ocho países de la Región de las Américas han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), con un total agregado de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%
- Los países son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, EE.UU., Panamá, Paraguay y Uruguay
- En comparación con promedios históricos, dos países registran aumentos significativos en la incidencia, Bolivia y Paraguay, este último asociado a un brote con exposición laboral
- Por su parte, en Argentina y Brasil se observó aumento en la letalidad. Cabe señalar que Argentina continúa siendo el país que reporta el mayor número de casos de hantavirus en la Región

Nota informativa - Medidas de prevención y control para prevenir la transmisión de influenza estacional

- Teniendo en cuenta el incremento de circulación de influenza A, incluyendo del subtipo H3N2, subclado K, en los países de la región se recomienda a la población: fortalecer las medidas de higiene de las manos, la etiqueta de la tos, el uso de mascarillas por parte de las personas que presentan síntomas o han dado positivo en las pruebas de detección
- Así mismo se debe tener en cuenta que se pueden presentar brotes de infecciones asociadas a la atención sanitaria por influenza, por lo que se recomienda el fortalecimiento de las medidas de precaución estándar y el uso de precauciones de transmisión por gotas al atender a pacientes


Síndrome respiratorio por coronavirus en Oriente Medio: Actualización mundial

- Desde principios de 2025 y hasta el 21 de diciembre de 2025, se han notificado a la OMS un total de 19 casos de coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), incluidas cuatro muertes
- De los 19 casos, 17 fueron notificados por el Reino de Arabia Saudita (KSA) y dos fueron notificados desde Francia
- La notificación de estos últimos casos no cambia la evaluación del riesgo, que sigue siendo moderada

- Estos casos muestran que el virus continúa representando una amenaza en los países donde circula en camellos dromedarios, con una propagación regular a la población humana
- La OMS recomienda la aplicación de medidas específicas de prevención y control de infecciones (PCI) para prevenir la propagación de las infecciones de MERS-CoV asociadas a la atención sanitaria y su posterior transmisión a los seres humanos

con una efectividad que oscila entre el 52% y el 57%

- Estas estimaciones preliminares respaldan los esfuerzos actuales para ofrecer la vacunación contra la influenza estacional a las poblaciones objetivo lo antes posible, a fin de mitigar el impacto de las infecciones de influenza, que se prevé será considerable durante la temporada actual. La efectividad de la vacuna fue:
- 44% (IC del 95%: 25-59) contra cualquier tipo de influenza;
- 52% (IC del 95%: 29-69) contra la influenza A(H3N2);
- 16% (IC del 95%: -43-54) contra la influenza A(H1N1)pdm09.
- Las estimaciones por edad para el virus A(H3N2) fueron del 52 % (IC del 95%: 21-72) entre las personas de 0 a 17 años y del 57% (IC del 95 %: 4-84) entre las personas de 18 a 64 años



III. Estudios y otras alertas

Estimaciones preliminares de la efectividad de la vacuna contra la gripe estacional que requiere atención médica en APS en Europa

- Los datos preliminares del estudio multicéntrico de atención primaria indican que las vacunas estacionales disponibles en la UE ofrecen protección contra la infección por influenza A(H3N2),

La actividad de la influenza en EE. UU. da un gran salto al confirmarse dos muertes en niños

- La actividad de la influenza en EE.UU. se ha disparado en todo el país, con 17 jurisdicciones (14 estados y Puerto Rico; Washington, DC; y la ciudad de Nueva York) que informan una enfermedad similar a la influenza (ILI) alta o muy alta y otros indicadores clave que aumentan notablemente, lo que señala el comienzo de la temporada

- Los CDC también notificaron dos nuevas muertes relacionadas con influenza en niños y proporcionaron datos sobre el aumento del subclado K entre los virus de la gripe H3N2 a medida que los estadounidenses se acercan a la temporada alta de reuniones con familiares y amigos

El USDA afirma que la detección de influenza aviar H5 en un rebaño lechero de Wisconsin es un nuevo evento de contagio (spillover)

- El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó que la reciente detección de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un hato lechero de Wisconsin representa un nuevo evento de propagación de la enfermedad desde la fauna silvestre
- En una actualización del 19 de diciembre, el APHIS indicó que la secuenciación del genoma completo confirmó que el virus detectado en un hato lechero de Wisconsin el 14 de diciembre es el H5N1 clado 2.3.4.4b, genotipo D1.1, que estuvo implicado en dos eventos de propagación en hatos lecheros de Nevada y Arizona a principios de este año
- El evento de propagación de Wisconsin se considera independiente de esos dos

eventos de propagación anteriores, indicó el APHIS. No se han detectado más hatos lecheros infectados

- “Esta detección no representa un riesgo para la salud del consumidor ni afecta la seguridad del suministro de leche comercial”, declaró el APHIS

3 nuevos casos de influenza aviar H9N2

- Hoy, por primera vez desde octubre, el Centro para la Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong informa nuevos casos de influenza aviar H9N2, tres de ellos con inicio de síntomas en noviembre
- Los pacientes proceden de las provincias de Guangdong y Hubei, así como de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, y no se ha especificado su edad. En 2025, se notificaron 29 casos de H9N2 en China continental. En 2024, el país registró un total de 11 casos

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.