



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
16 de Enero 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 1

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 53 fue 746 (semana pasada 932): SARS-CoV-2 representa el 36,7%, Rinovirus 32,5%, Influenza A 7,5%
- Influenza A: continúa franca disminución con respecto a semana pasada (59 versus 131 semana pasada), similar a mismo período 2025 (61)

Recomendaciones:

- Aunque ha disminuido, se mantiene circulación de virus respiratorios, y continúa siendo importante la vacunación, el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla

Situación Influenza Cono Sur

Niveles de transmisión de la influenza estacional

Subregión	País	Tendencia	Positividad Influenza (últimas 4 SE)	Nivel PISA	Última SE de reporte
Brazil y Cono Sur	Argentina	▼		Bajo	52
Brazil y Cono Sur	Brasil	▼		Basal	53
Brazil y Cono Sur	Chile	▼		Bajo	53
Brazil y Cono Sur	Paraguay	▼		Basal	53
Brazil y Cono Sur	Uruguay	■		Basal	53


II. Alertas Internacionales

OPS: Alerta Epidemiológica Circulación simultánea de

influenza estacional y virus sincitial respiratorio

- El 4 de diciembre del 2025, la OPS/OMS alertó sobre posible actividad temprana o más intensa de virus respiratorios durante la temporada 2025-26
- Se recomienda a los Estados Miembros a mantenerse vigilantes para ajustar los planes de preparación ante la posible ocurrencia de brotes concomitantes de influenza estacional y VRS que puedan sobrecargar el sistema de salud
- En la Región de las Américas, la positividad de influenza se mantiene por encima del 10% en el Hemisferio Norte
- En la mayoría de las subregiones predomina la circulación de A(H3N2), mientras que en la subregión Andina se observa predominio de A(H1N1)pdm09
- La intensidad es heterogénea, con incrementos sostenidos en América del Norte y Central y niveles cercanos al 20% en el Caribe y América Central
- En contraste, la circulación de VSR se mantiene en niveles bajos con señales iniciales de aumento en América del Norte

Influenza



Requisito de inclusión no cumplido
No aplicable
Sin información
Gran Disminución (>20% de disminución absoluta)
Disminución media (11-20%)
Pequeña disminución (2,6-10%)
Similar (2,6% a 2,5%)
Pequeño aumento (2,6-10% de aumento)
Aumento medio (11-20% de aumento)
Gran aumento (>20% de aumento)

II. Alertas Nacionales

MINSAL informa caso importado de sarampión en Chile

- El MINSAL informa que el ISP confirmó el 9 de enero de 2026 un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana: se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país. El paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento
- Los equipos están realizando el seguimiento de los contactos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades continúan con la vigilancia epidemiológica
- Chile mantiene su estatus de "eliminación de sarampión". El último caso importado registrado en el país fue en 2023
- En Comisión de Salud del Senado, la subsecretaria Albagli hizo un llamado a la población de mantener la calma y revisar si cuenta con la vacunación correspondiente. "En Chile se vacuna a los niños al año y los tres años. Las dosis permiten una inmunidad de más de un 90%. También recordó que el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria
- En este escenario, Minsal recomendó a la población que viajará al extranjero, revisar su

esquema de vacunación y en el caso de menores de 1 año, adelantar el procedimiento. En el caso de nacidos entre 1971 y 1981, la autoridad planteó la necesidad de vacunarse dado que no existe certeza que esa población haya recibido las dos dosis necesarias

- La epidemióloga de UNAB, María Paz Bertoglia, aclara en CNN qué hacer ante la sospecha de sarampión: acudir lo antes posible a un centro de salud, avisando previamente su llegada para que se adopten medidas de aislamiento, usar mascarilla al salir del hogar, evitar el contacto con otras personas, e informar sobre antecedentes de viajes. "La notificación oportuna permite proteger a otras personas y activar la investigación epidemiológica", explicó.

III. Estudios y otras alertas

La deforestación está dando a los mosquitos un mayor gusto por la sangre humana, sugiere un estudio

- A medida que los bosques se reducen y la vida silvestre desaparece, los mosquitos recurren cada vez más a las personas para alimentarse de sangre, un cambio que genera gran preocupación sobre la posible propagación de enfermedades que afectan a los humanos

- Un nuevo estudio sugiere que insectos zumbadores y picadores desempeñan un papel cada vez mayor en el aumento de la transmisión del zika, la fiebre amarilla, el dengue y otras enfermedades que los mosquitos transmiten a las personas, debido en parte a la desaparición de sus hábitats

¿Por qué la influenza es tan grave este año? Una variante altamente mutada ofrece respuestas

- La subvariante que actualmente domina la circulación presenta un alto número de mutaciones clave, siendo más diferente a la cepa utilizada en la vacuna antigripal. Esto podría facilitar que el virus ignore el sistema inmunitario y las vacunas
- La cepa dominante pertenece a un subtipo viral que ha circulado durante décadas, pero que no fue dominante en las últimas temporadas, lo que significa que muchas personas tienen una inmunidad débil contra ella
- Aun así, existen evidencias que sugieren que las vacunas actualmente disponibles ofrecen protección contra la enfermedad grave

USA: Estados y organizaciones de salud rechazan las nuevas directrices de vacunación de los CDC

- Un número creciente de estados

se opone a los cambios radicales en el calendario de vacunación infantil de EE. UU.

- Los CDC redujeron el número de vacunas recomendadas universalmente de 17 a 11. Desde entonces, al menos 19 estados han anunciado que no seguirán el nuevo calendario de los CDC. En cambio, seguirán las directrices de vacunación de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP)

Cómo mejorar las coberturas de vacunación: un amplio estudio ofrece pistas

- Alrededor de dos tercios de las personas en el Reino Unido que inicialmente dudaron en vacunarse durante la pandemia de COVID-19 finalmente recibieron al menos una dosis
- Utilizando datos de casi 38.000 personas que reportaron dudas sobre la vacuna (el 65% de las cuales recibió una o más dosis), investigadores descubrieron que los motivos de la duda podían agruparse en ocho grandes grupos, incluyendo las preocupaciones sobre la eficacia de la vacuna y su salud personal

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.