




**BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y ALERTAS
PANDÉMICAS**

28 de agosto 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl
Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I Informe Virus Respiratorios Semana 33

- El total de virus respiratorios confirmados durante SE33 fue **2.939** (leve aumento desde la semana anterior: 2.703)
- Distribución: Rinovirus 32,3%, VRS 26,6%, Influenza B 14,3%, Metapneumovirus 13,1%, Influenza A 5,3%, Adenovirus 3,8%, Parainfluenza 3,1%, OVR 1,3%, SARS-CoV2 0,2%

Cobertura Vacuna Influenza	Cobertura VRS
Total 79,1%	Lactante 96,4% RN 98,6%

II Alertas Internacionales

- Durante la semana epidemiológica 34 la OMS examinó 604.275 señales epidemiológicas (627.661 la semana previa). Resumen:

Region	Hazard
Africa	Crimean-Congo haemorrhagic fever Diphtheria Mpox
Americas	Influenza due to identified avian or animal influenza virus Substandard or falsified medical product Leptospirosis Mpox Chikungunya virus disease Brucellosis
Eastern Mediterranean	No publicly available signals identified
Europe	Crimean-Congo haemorrhagic fever West Nile fever Measles Salmonella infections
South-East Asia	Cholera
Western Pacific	No publicly available signals identified

Enfermedad por Virus Ébola (cepa Bundibugyo), RDC

- Desde el último reporte, el brote se ha expandido desde 54 a 60 zonas sanitarias
- Se han notificado 5.794 casos confirmados, incluidas 2.786 defunciones (tasa de letalidad 48,1%)
- El brote sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional

Uganda pone fin al brote de ébola tras completar 42 días

- Hoy se ha celebrado el fin del brote de ébola causado por la especie Bundibugyo en Uganda
- Esto tras 42 días consecutivos sin nuevos casos confirmados, desde que el último paciente del país (un caso importado) recibiera el alta el 16 de julio de 2026

Actualización epidemiológica Influenza aviar A(H5) en la Región de las Américas

- Entre 2021 y marzo del 2026 se han reportado más de 600 especies de aves silvestres y de producción avícola y más de 100 especies de mamíferos afectados por virus de la influenza aviar con potencial zoonótico A(H5Nx)
- En mayo del 2026, FAO, la OMSA y la OMS determinaron que el riesgo para la salud pública mundial asociado a los virus (IAAP) A(H5) pertenecientes al linaje Gs/Gd se mantiene bajo
- Asimismo, para personas con exposición ocupacional o frecuente, el riesgo se estimó de bajo a moderado
- Se alienta a los Estados Miembros a utilizar las herramientas desarrolladas por OPS para apoyar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, y la realización periódica de evaluaciones intersectoriales de riesgos

Tabla 1. Brotes de influenza aviar A(H5) en aves y mamíferos en la Región de las Américas 2026, hasta el 15 de julio del 2026

País	Total de brotes	Brotes en aves silvestres	Brotes en aves de corral o aves domésticas	Brotes en mamíferos silvestres	Brotes en mamíferos domésticos
Argentina	23	4	19	0	0
Brasil	5	2	3	0	0
Canadá	21	2	18	0	1
Chile	42	10	32	0	0
Colombia	2	0	2	0	0
Ecuador	1	1	0	0	0
México	3	2	1	0	0
Perú	49	0	49	0	0
Uruguay	8	8	0	0	0
Estados Unidos de América	301	6	227	44	24
Total	455	35	351	44	25

III Alertas Nacionales

Alza de hantavirus en Chile: 49 casos y 19 fallecidos durante 2026

- La infección transmitida por el ratón de cola larga mantiene una distribución concentrada en zonas rurales y semiurbanas del centro-sur del país, desde la Región de O'Higgins hasta Magallanes
- De los 49 casos, 19 personas fallecieron, lo que sitúa la letalidad en 39%. Respecto a los fallecidos, el 68% corresponde a hombres y se presenta una mediana de edad de 37 años
- En comparación con el año anterior, en 2025 se registraron 44 casos de hantavirus y solo ocho casos fallecidos a causa de esta enfermedad

IV Estudios y Otras Alertas

Dos trabajadores del aeropuerto de Frankfurt mueren de malaria tras la llegada de mosquitos en un avión

- Un total de seis funcionarios varones resultaron infectados en el brote; los cuatro sobrevivientes fueron trasladados al hospital y actualmente se están recuperando
- Las autoridades consideran que las infecciones fueron causadas por un mosquito Anopheles que llegó al país a bordo de una aeronave

Diez años de la epidemia de Zika en Brasil, los niños siguen pagando las consecuencias

- Una década después del brote, está surgiendo una segunda ola de complicaciones en los bebés con Zika
- Más de 3.080 niños nacieron con el síndrome congénito por virus del Zika (SCZ) tras un brote devastador de este virus transmitido por mosquitos que azotó Brasil en 2015-2016
- Al menos 444 han fallecido, principalmente a causa de enfermedades respiratorias e infecciosas
- De los sobrevivientes, las tasas de mortalidad vuelven a aumentar a medida que los niños se acercan a la adolescencia

V Reuniones, Webinar y Congresos

Mejora de la supervivencia en la enfermedad por filovirus, incluidos el ébola y el marburgo: lanzamiento de las guías clínicas OMS

- Lanzar y difundir las nuevas directrices de la OMS para el manejo clínico de la enfermedad por filovirus
- 2 de septiembre (7:00 am Chile)

VI Arte y Salud

Breve reseña de cinco obras de divulgación científica

- **When the forest breathes:** documenta los efectos de la tala rasa en las reservas de carbono y la biodiversidad
- **The unconscious:** Dentro de la rúbrica conceptual de "el inconsciente" encontramos una torre de Babel de confusión y disputa
- **The dark frontier:** un extraordinario retrato de las profundidades oceánicas examina su rol en el mantenimiento de un planeta viable
- **Artificially yours:** La compleja relación entre compañeros de inteligencia artificial y la amistad humana es el tema del libro
- **After COVID:** La pandemia evidenció la vulnerabilidad mundial, no solo ante enfermedades infecciosas, sino también ante la desinformación y el deterioro de la confianza

Dolly Parton fallece a los 80 años; investigadores celebran sus contribuciones a la ciencia

- La cantante de música country fue una defensora de las vacunas, la salud pública, la alfabetización y las comunidades marginadas